



# โรคพิษสุนัขบ้า



## กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

## การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ



กัด



ข่วน



เลียบาดแผล

## อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม

กลืนลำบากกลืนน้ำ

คันรุนแรง

อัมพาตตาย

บริเวณที่เคยถูกกัด

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

### ระยะแรก

- อีซียเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง ม่านตาขยาย

### ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- ห่าหอน

### ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

## อย่าแห่

คาถา ๕ ย กัณสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

## อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ



## อย่าแยก

สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

เปลา



## อย่าหยิบ

อาหารที่สุนัขกำลังกิน



## อย่ายุ่ง

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ



เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค **ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%**


## คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง มาตามนัดทุกครั้ง

## \*\*\*คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง\*\*\*



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

