



ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้า กัด หรือ เลีย

1. รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง พยายามล้างให้เข้าถึงรอยลึกของแผล ถ้าไม่มีสบู่ใช้ผงซักฟอกแทนก็ได้
2. ทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์ไอโอดีน น้ำยาฟิวรีน หรือ ทิงเจอร์เมโทโอเลท ถ้าแผลฉกรรจ์มีเลือดออก ควรปล่อยให้เลือดออกกระยะหนึ่งเพื่อล้างน้ำลายซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสออก
3. ควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ทานยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดแผลมาก ชา หรือ คันรอบ ๆ แผล มีไข้ขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์
4. ถ้าสุนัขตาย ให้ตัดหัวสุนัขไปตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตาย ให้ขังไว้ดูอาการ 16 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีน การรักษาทางสมุนไพรหรือแพทย์แผนโบราณ ไม่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
5. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่าหรือเป็นสัตว์ที่กัดแล้วหนีไป ก็จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน
6. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า คือ ผู้ที่มีแผลถลอก แผลเป็นรอยเขียวช้ำ หรือมีเลือดไหล รวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก ถ้าถูกเลียที่ผิวหนังที่ไม่มีแผล หรือเพียงแต่อุ้มสุนัข ไม่สามารถติดโรคได้



โรคพิษสุนัขบ้า



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โรคพิษสุนัขบ้า



เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies virus ติดต่อในสัตว์เลือดอุ่น รวมถึงคนด้วย ผู้ที่เป็นโรคมั้มีอาการเสียชีวิต 100%



เมื่อไหร่ ต้องฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดก่อนสัมผัสสัตว์
ทำในผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัด
เช่น สัตวแพทย์ เด็ก หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า



ฉีดหลังสัมผัสสัตว์
ต้องฉีดในกรณีนี้

1. ถูกจับเป็นรอยข่วน
2. น้ำลายของสัตว์ถูกผิวหนัง
ที่มีรอยถลอกหรือมีแผล
3. ถูกข่วนที่ผิวหนัง
4. ถูกกัดเป็นแผล
5. น้ำลายหรือเลือด
จากร่างกายสัตว์ ซากสัตว์
ถูกเขี่ยตา จมูกและแผล



คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทางใดได้บ้าง?

คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เนื่องจากรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาจากสัตว์ที่เป็นโรคได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ ที่เป็นโรค จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย จะไม่ติดโรคจากสัตว์นั้น นอกเสียจากว่ามีบาดแผล รอยถลอก หรือ รอยขีดข่วนโดยบุคคลนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้จะทำให้ ผู้ที่ถูก สัตว์ที่เป็นโรคเลีย เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้งการถูกเลียที่ริมฝีปาก หรือนัยน์ตา ก็จะทำให้เป็นโรคนี้ได้

ถ้าถูกสัตว์กัดจะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพียงใด?

-ถ้าสัตว์ที่กัด ไม่ได้คิดเชื้อพิษสุนัขบ้า จะไม่มีโอกาสเป็นโรค แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าสัตว์เป็น โรคหรือไม่ ต้องคิดว่า สัตว์เป็น โรคไว้ก่อน

-ผู้ที่ถูกสุนัขหรือสัตว์ที่เป็น โรคกัด ไม่ป่วยเป็นโรคทุกราย โอกาสเป็นโรคเฉลี่ยประมาณ **35%** ขึ้นกับบริเวณ ที่ถูกกัด

ถ้าถูกกัดที่ขา โอกาสเป็น โรคประมาณ **21%**

ถูกสุนัขบ้ากัด นานเท่าใดจึงมีอาการ?

ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งปรากฏอาการของโรค (ระยะฟักตัว) จะแตกต่างกันได้มาก พบได้ตั้งแต่ **4 วันจนถึง 4 ปี** แต่ส่วนมากมักมีอาการในช่วงระหว่าง สัปดาห์ที่ **3** จนถึงเดือนที่ **4** ประมาณ **70%** จะเป็นโรครภายใน **3** เดือน หลังถูกกัดประมาณ **96%** จะเป็นโรครภายใน **1** ปีหลังถูกกัด

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีอาการเป็นอย่างไร พบได้สองแบบ

1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่น ถ้าผูกโซ่หรือขังไว้ในกรง จะกัดโซ่หรือกรง หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้อย่างดุร้าย บางครั้งสุนัขจะกัดจนฟันหักหรือ ลิ้นเป็นแผลมีเลือดออก เมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ **2-3** วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซและตายในที่สุด

2. แบบเชื่องซึม มีอาการปากอ้า หุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล้ำ ห้อยออกมานอกปาก บางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่ มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ โดยเจ้าของมักเอานิ้วล้วงออก แต่ไม่พบกระดูก สุนัขจะเอาขาหน้าตะกุกบริเวณแก้ม ปากและคอจะบวม สุนัขจะลุกนั่งและขึ้นเดินไปมา บ่อยๆ กินของแปลกๆ เช่น ใบไม้ ก้อนหิน หรือบางตัวก็ กินปัสสาวะตัวเอง สุนัขแบบเชื่องซึมนี้นี้จะไม่กัด