



โรคคางทูม (Mumps)

โดยปกติในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยโรคคางทูมเป็นเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปีนี้พบว่าผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในช่วงอายุเด็กโต วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่



อาการส่วนใหญ่ ไม่รุนแรง

อัตราการเสียชีวิต ต่ำ

อาการ



แกำม/ขารรโร
บวมโต



ปวดเวลาเคี้ยว
หรือกลืน



มีไข้ ปวดหัว
อ่อนเพลีย

แต่แพร่กระจายได้ง่ายมาก ผ่านการ ไอ จาม

ขึ้นที่เสียงสูง



สถานที่ที่มีการอยู่รวมกันอย่างใกล้ชิด:
โรงเรียนประจำ หอพัก ค่ายทหาร

ป้องกัน



สวมหน้ากาก
เมื่อมีอาการ
ทางเดินหายใจ



ล้างมือบ่อยๆ
รักษาความสะอาด
สม่ำเสมอ



แยกตัว
งดกิจกรรมรวม
กลุ่มหากป่วย

เกราะป้องกันที่ดีที่สุด: วัคซีน MMR



เด็กเล็ก

ผู้ปกครองต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
รับวัคซีน ครบถ้วน ตามเกณฑ์



วัยรุ่น/ผู้ใหญ่

หากไม่แน่ใจประวัติ หรือฉีดไม่ครบ
ควรปรึกษาแพทย์ทันที

นอกจากนี้โรคคางทูมยังส่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้มีผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่น



การอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง



ในเพศชายอาจทำให้
อัณฑะอักเสบ



ในเพศหญิงอาจทำให้
ท่อนำรังไข่อักเสบ